



【化学成分】

活性成分：他达拉非 20 mg
剂 量：按照医生的指示。(一次一片)
储 存：请在室温 30℃ 以下储存。

【功效】

Megalis 是治疗男性 ED (勃起功能障碍) 的口服药。该产品是含有 20mg 他达拉非的仿制药。Megalis 的主要功效是增加阴茎的血流量。

【剂量有效时间】

Megalis 在性行为前约 60 分钟服用一片，效果可持续大约 36 小时。

【注意事项】

- 患有过敏、贫血、眼部疾病、癌症、高血压及低血压、心律不齐、心力衰竭、胸口疼痛、特殊疾病的人群，请在医生指导下服用。
- 为避免副作用加深，在药效发挥时请勿突然起身或起立。
- 饮酒前后服用会减轻药效，请注意。
- 18 岁以下未成年人请勿服用本品。
- 如已经服用了其他治疗男性勃起功能障碍的药物，请勿同时服用 Megalis。
- 如同时使用前列地尔 (Caverject、MUSE、EDEX) 或育亨宾 (Yocon、Yodoxin、其他)，请在服用 Megalis 前咨医生。

【禁止与 Megalis 同时服用的药物】

Megalis 切勿与硝酸甘油同时服用。
Megalis 和硝酸甘油都具有扩张血管的作用，同时服用会引起血压急剧降低。若血压过低，可能会有生命危险。

【可能引起的副作用】

部分服用本品的患者可能会出现头痛、腹泻、头晕、胃部不适、呕吐和鼻塞等不良反应。少量患者会出现持续勃起或勃起时间延长的情况。为避免造成严重后果，若过长时间处于勃起状态，请及时就医。

【药物相互作用】

对服用含有机硝酸酯类药物接受治疗的患者，医生不会开具 Megalis。Megalis 的血药浓度会受红霉素、酮康唑、伊曲康唑、沙奎那韦等药物的影响而上升。上述药物与 Megalis 有相互作用。

【过量服用】

如过量服用 Megalis 会引发昏厥、胸痛、想吐、心跳不齐、体位性低血压症状。如出现上述症状，请停止服用并及时就医。

【保存方法】

请放于干燥处，避免阳光直射，在常温下保存。
请勿放在儿童或宠物容易接触到的地方。
远离潮湿，阳光，不能接触到儿童和宠物，请保持室温。

【약품구성】

유효 주성분：타다라필20mg
복 용 량：의사의 지시를 따르십시오. (1회 1정)
보 관：실온 30 ℃ 이하의 장소에 보관하십시오.

【효과】

메갈리스는 남성의 ED (발기 부전)을 치료하기 위한 경구 치료제입니다. 이 제품은 타다라필20mg을 함유하고 있는 시알리스의 제네릭 약품입니다. 메갈리스의 주요 효능은 음경에 혈액의 양을 증가시키는 것입니다.

【복용량과 효과유효시간】

메갈리스는 성행위의 약60분전에 1알을 복용하시면 약36시간의 효과를 기대할 수 있습니다.

【주의사항】

- 알레르기,빈혈,안과 질환,암,고혈압이나 저혈압,부정맥,심부전,가슴 통증, 특정 질환등 지병이 있으신 분은 의사와 상담하십시오.
- 부작용을 악화시킬 수 있으므로 약물이 효과가있는 상태에서 갑자기 일어나거나일어서거나 하지 마십시오.
- 음주전후 복용은 효과가 반감되므로 삼가하십시오.
- 18세 미만의 미성년자는 메갈리스를 복용하지 마십시오.
- 이미 다른 ED치료약을 복용하시고 있는 경우에는 메갈리스를 동시에 복용하지 마십시오.
- 알프로스타딜(Caverject,Muse,EDEX)또는 요힘빈(Yocon,Yodoxin,그외)을 메갈리스와 함께 복용하실 경우에는 사용 전에 의사와 상담하는 것이 좋습니다.

【메갈리스의 병용금지약】

메갈리스는 니트로글리세린과의 병용이 금지되어 있습니다. 이유는 메갈리스와 니트로글리세린은 모두 혈관을 확장시키는 작용이 있기 때문에 급격한 혈압 저하를 초래합니다. 또한 급격한 혈압 저하로 인하여 생명에 지장을 줄수도 있습니다.

【부작용의 가능성】

일부 복용자중에는 두통,설사,현기증,위장 장애,구토,코막힘이 발생하는 부작용이 있습니다. 또한 메갈리스는 발기 또는 장시간의 발기 상태를 지속시켜줍니다.

발기 상태가 장시간 지속될 경우에는 심각한 상태가 될 수 있으므로 일단 의사와 상담하십시오.

【약물의 상호 작용】

메갈리스는 유기질산염을 포함하는 있는 약물 요법으로 치료를 받고 계시는 분은 의사로부터 처방을 받으실수 없습니다. 메갈리스의 혈중 농도는 에리트로마이신, 케토코나졸,이트라코나졸및 사쿠나비어등의 영향으로 상승합니다. 이러한 약물은 메갈리스와의 상호 작용이 있는 것으로 알려져 있습니다.

【과다복용】

메갈리스를 과다 복용으로 기절,가슴 통증,심한 구토,불규칙한 심장 박동, 현기증이 발생할 수 있습니다. 이 경우는 사용을 중지하고 즉시 의사의 진단을 받으십시오.

【보관방법】

습기,직사광선을 피하고 어린이와 애완동물이 닿지 않는 곳에 두고 상온에서 보관하십시오.