

**【薬品構成】**

有効成分:タダラフィル20mg

服 用 量:医師の指示に従ってください。(通常1回1錠)

保 管:室温30℃以下の場所で保存してください。

【効能】

メガリスは男性のED(勃起不全)を治療するための経口治療薬です。この製品はタダラフィル20mgを含有するシアリスのジェネリック薬品になります。メガリスの主な効能はペニスへの血液量を増加させるものです。

【投与量と効果有効時間】

メガリスは行為の約60分前に1錠服用し、約36時間程度の効果が期待できます。

【注意事項】

- ・アレルギー、貧血、眼疾患、癌、高血圧や低血圧、不整脈、心不全、胸の痛み、特定の疾患などの持病をお持ちの場合は、かかりつけの医師に相談してください。
- ・副作用を悪化させる可能性があるため、薬が効いている状態で急に起き上がった、立ち上がったしないでください。
- ・飲酒前後の服用は効果が半減するため控えてください。
- ・18歳以下の方は、メガリスを服用しないでください。
- ・すでに別のED治療薬を服用している場合、メガリスの同時服用はしないでください。
- ・アルプロスタジル（Caverject、ミューズ、EDEX）またはヨヒンビン（Yocon、Yodoxin、他）をメガリスと併用する場合は使用前に医師に相談することをお勧めいたします。

【メガリスの併用禁忌薬】

メガリスはニトログリセリンとの併用が禁忌とされています。理由はメガリスとニトログリセリンには、どちらも血管を拡張させる作用があることから、急激な血圧の低下をもたらします。さらに血圧が低下しすぎると、最悪生命の危険を引き起こすことにもなります。

【副作用の可能性】

一部の服用者の中には副作用として、頭痛、下痢、めまい、胃のむかつき、嘔吐、鼻づまりが発生することがあります。またメガリスは、持続勃起症または長時間の勃起状態が続くことが稀にあります。深刻な状態になることがありますので勃起状態が長時間継続した場合には一度医師にご相談ください。

【薬物相互作用】

メガリスは、有機硝酸塩が含まれている薬物療法で治療している患者に対しての処方医師からされてはおりません。メガリスの血中濃度は、エリスロマイシン、ケトコナゾール、イトラコナゾールおよびサキナビルなどの影響により上昇いたします。これらの薬はメガリスとの相互作用があることが知られています。

【過剰摂取】

メガリスを過剰摂取した場合、失神、胸痛、吐き気、不規則な心拍、立ちくらみが発生することがあります。その場合は使用を止め、直ちに医師の診断を受けてください。

【保管方法】

湿気、日光をさけ、子供やペットの届かないところに置き、常温で保管してください。

【Drug Facts】

Active Ingredient: Tadalafil 20mg per tablet

Usual Dosage: As directed by the Physician. (Take 1 tablet by mouth)

Storage: Store below 30℃

【Efficacy】

Megalis is an oral remedy for treating male ED (erectile dysfunction). This product is a generic drug of Cialis containing 20 mg of Tadalafil. The main efficacy of Megalis is to increase blood volume to penis.

【Common use】

Megalis takes one tablet about 60 minutes before the act, and about 36 hours of effect can be expected.

【Precautions】

- ・ Please consult your family doctor, If you have a medical conditions such as allergy, anemia, eye disease, cancer, hypertension or hypotension, arrhythmia, heart failure, chest pain, certain diseases etc,
- ・ Since there is a possibility of worsening side effects, please do not get up or rise suddenly when medication is working.
- ・ Taking the drug before or after drinking an alcohol, An effect will be reduced to half, so please refrain.
- ・ If you are under 18 years old, please do not take Megalis.
- ・ Do not take Megalis at the same time if you are already taking another ED medications.
- ・ When using Megalis, with Alprostadil (Caverject, Muse, EDEX) or Yohimbin (Yocon, Yodoxin, etc.), We recommend that you consult your doctor before use.

【Contraindications】

Megalis is used in combination with nitroglycerin is prohibited Since Both megalith and nitroglycerin have the effect of expanding blood vessels, It brings about a sharp decrease in blood pressure. Furthermore, if blood pressure falls too much, it will cause the danger of your life.

【Possible side effects】

Some of the recipients may cause headache, diarrhea, dizziness, upset stomach, vomiting, stuffy nose may occur As side effects, In addition, it is rare case but you have a priapism or a long time erection state continues. Please consult your doctor once if the erection state lasts for a long time Because it may become a serious condition.

【Drug interactions】

Megalis is not prescribed by a doctor for patients treated with medication therapy which contains organic nitrate. The blood concentration of megalith is raised by the influence of erythromycin, ketoconazole, itraconazole, saquinavir, etc. These drugs are well-known to interact with Megalis.

【Overdose】

Syncope, chest pain, nausea, irregular heartbeat, dizziness may occur when you overdose with Megalis. In that case, stop taking and consult with medical institutions or doctors immediately.

【Storage】

Please avoid moisture and sunlight, Keep out of the reach of children and pets, Keep in room temperature.